

Created: Jul 23-2018
Updated: Aug 8-2022
Approved: Aug 8-2022
Size: 3.5" w x 8.5" h
Prints: Black, PMS 369

FOR REFERENCE ONLY.
FOR PRINT FILE
PLEASE CONTACT
BASF@CITY-IMAGING.COM

THIS SEED HAS BEEN TREATED WITH

Insure[®] Cereal FX4

Seed Treatment

**CONTAINS: Pyraclostrobin, Fluxapyroxad,
Triticonazole and Metalaxyl**

**REGISTRATION NO. 33210
PEST CONTROL PRODUCTS ACT**

**DO NOT USE FOR FOOD, FEED OR
OIL PROCESSING.**

**IN CASE OF EMERGENCY ENDANGERING
LIFE OR PROPERTY INVOLVING THIS PRODUCT,
CALL DAY OR NIGHT, 1 (800) 454-2673**

This seed has been treated with Insure Cereal FX4 containing fungicides pyraclostrobin, fluxapyroxad, triticonazole and metalaxyl. Workers handling or planting treated seed must wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, shoes and socks. Workers handling treated seed should wear suitable dust mask. Use a closed-cab tractor when planting treated seed. Gloves are not required within a closed cab.

DO NOT use for food, feed or oil processing. Store away from feed and food stuff. Keep treated seed out of reach of children and animals.

A rotational plantback interval of 30 days must be observed for crops not listed on the label.

Toxic to birds. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.


We create chemistry

CETTE SEMENCE A ÉTÉ TRAITÉE AVEC

Insure^{MD} Cereal FX4

Traitement des Semences

**CONTIENT: Du Pyraclostrobine, Fluxapyroxad,
Triticonazole et Métalaxyl**

N° D'HOMOLOGATION 33210

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**NE PAS L'UTILISER POUR L'ALIMENTATION
HUMAINE ET ANIMALE OU POUR
L'EXTRACTION D'HUILE.**

**EN CAS D'URGENCE DÛ À CE PRODUIT METTANT
LA VIE OU DES BIENS EN DANGER, TÉLÉPHONEZ
LE JOUR OU LA NUIT, 1 (800) 454-2673**

Cette semence a été traitée avec Insure Cereal FX4 qui contient des fongicides pyraclostrobine, fluxapyroxad, triticonazole et du métalaxyl. Les travailleurs qui effectuent la manipulation ou qui sèment des grains traités doivent porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Les travailleurs manipulant des semences traitées devraient porter un masque approprié pour la poussière. Utiliser un tracteur à cabine fermée pour le semis de blé et d'autres céréales traités. Le port des gants n'est pas requis pendant l'application à partir d'une cabine fermée.

NE PAS l'utiliser pour l'alimentation humaine et animale ou pour l'extraction d'huile. Entreposer à l'écart des aliments pour animaux et humains. Conserver les semences traitées hors de la portée des enfants et des animaux.

Pour les cultures qui ne figurent pas sur les étiquettes, il faut respecter un délai d'attente de 30 jours entre le dernier traitement et le semis de la culture de rotation.

Toxique pour les oiseaux. Toutes les semences dispersées ou exposées doivent être incorporées dans le sol ou autrement nettoyées de la surface du sol.

 **BASF**

We create chemistry

2208