

Fongicide Cabrio

Fiche technologique

Maîtrise supérieure des maladies avec les **Avantages pour la santé des plantes** démontrés dans les fruits et légumes.

- Suppression d'un large spectre de maladies importantes
- Se lie rapidement à la surface des feuilles pour une résistance rapide au délavage par la pluie
- Inhibe la germination des spores fongiques pour prévenir l'infection
- Procure des **Avantages** exclusifs **pour la santé des plantes**¹ pour une maîtrise de la maladie, une gestion du stress et un potentiel de rendement améliorés

Ingrédient actif

Pyraclostrobin (groupe 11)

Préparation

Granulé émulsifiable


Contenu d'une caisse

4 cruches de 2,27 kg

Entreposage

Conserver à l'abri du gel

Cabrio^{MD} pénètre dans la feuille



Cabrio interfère avec la respiration et avec la production d'énergie des cellules fongiques, ce qui provoque l'arrêt de la croissance et la mort du champignon.
Source: BASF

Cultures et calendrier de traitement

Bleuets (en corymbe et nains)

Intervalle de 10 à 14 jours

Maladies maîtrisées

Anthraxose, phomopsis

Cucurbitacées

Intervalle de 7 jours

Intervalle de 7 à 14 jours

Alternariose, anthracnose, chancre gommeux
Blanc

Feuilles de betterave potagère/ radis

Intervalle de 7 jours

Intervalle de 7 à 14 jours

Blanc
Alternariose

Fraises

Intervalle de 7 à 14 jours

Anthraxose

Fruits à noyau

Intervalle de 7 à 14 jours

Intervalle de 7 à 14 jours

Anthraxose
Blanc (cerises seulement)

Légumes-bulbes

Intervalle de 7 à 14 jours

Intervalle de 10 jours

Tache pourprée
Mildiou

Légumes-fruits

Intervalle de 7 jours

Intervalle de 7 à 14 jours

Mildiou
Anthraxose, alternariose, tache cercosporéenne

Légumes-racines

Intervalle de 7 jours

Intervalle de 7 à 14 jours

Blanc
Alternariose, tache cercosporéenne

Utiliser un intervalle plus court pendant les périodes de croissance rapide ou de forte pression de la maladie.

 **BASF**

We create chemistry

¹ Les **Avantages pour la santé des plantes** concernent les produits qui contiennent l'ingrédient actif pyraclostrobin. Toutes les comparaisons sont par rapport au traitement habituel du producteur, à moins d'indication contraire.

Doses

Une cruche de Cabrio traite de 2 à 4 hectares (5 à 10 acres).

Cultures	Maladies maîtrisées	Dose d'application
Bleuets (en corymbe et nains)	Anthraxose, phomopsis	1 kg/ha
Cucurbitacées	Alternariose, anthracnose, oidium chancre gommeux	0,56 – 0,84 kg/ha 0,84 kg/ha
Feuilles de betterave potagère/ radis	Alternariose, tache cercosporéenne Blanc	0,56 – 1,1 kg/ha 0,56 – 0,84 kg/ha
Fraises	Anthraxose	0,56 – 1,0 kg/ha
Fruits à noyau	Anthraxose, blanc (cerises seulement)	0,67 kg/ha
Légumes-bulbes	Alternariose (tache pourpre), mildiou	0,56 – 0,84 kg/ha
Légumes-fruits	Anthraxose, alternariose Mildiou	0,56 – 0,84 kg/ha 0,56 – 1,0 kg/ha
Légumes-racines	Alternariose, tache cercosporéenne Blanc	0,56 – 1,1 kg/ha 0,56 – 0,84 kg/ha

Séquence des mélanges

1. S'assurer que le réservoir du pulvérisateur est propre avant l'utilisation.
2. Remplir le réservoir à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
3. Ajouter la quantité requise de fongicide Cabrio dans la cuve.
4. Remplir le reste du réservoir tout en continuant d'agiter.
5. Après l'utilisation, nettoyer le réservoir conformément aux directives de l'étiquette.

Conseils pour l'application

Résistance au délavage par la pluie – 1 heure.

Délai de sécurité après traitement – 12 heures, à l'exception de :

Bleuets en corymbe, récolte manuelle – 1 jour

Légumes-bulbes, éclaircissage – 3 jours

Cucurbitacées, récolte manuelle, éclaircissage et taille – 3 jours

Légumes-racines, récolte manuelle – 3 jours

Fruits à noyau, éclaircissage et taille à la main - 9 jours

Gestion de la résistance – Cabrio devrait être intégré dans un programme global de lutte contre les maladies et ravageurs. Les pratiques culturales reconnues pour réduire le développement des maladies doivent être suivies. Utiliser alternance avec d'autres fongicides offrant des modes d'action différents. Ne pas dépasser le nombre total d'applications consécutives ni le nombre total d'applications par saison précisés dans la section de l'étiquette portant sur la culture voulue.

Délai d'attente avant la récolte

7 jours pour les légumes-bulbes

0 jour pour les feuilles de betterave potagère / radis

3 jours pour les cucurbitacées

0 jour pour les légumes-fruits

3 jours pour les légumes-racines

Mélanges en réservoir

Aucun mélange n'est recommandé sur l'étiquette.

Communiquez avec le service à la clientèle **AgSolutions^{MD}** ou votre représentant BASF pour de l'information sur les mélanges en réservoir approuvés.

Pour plus d'information :

Appelez le Service à la clientèle **AgSolutions** au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca/horticoles

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette,