

Fongicide Headline

Fiche technologique

Le fongicide Headline^{MD} procure une maîtrise systémique de l'alternariose et du mildiou, les deux maladies les plus dévastatrices dans les pommes de terre.

- Suppression efficace démontrée des souches sensibles d'alternariose et de mildiou.
- Pas de délavage par la pluie; activité systémique et résistance à la pluie en une heure pour assurer une maîtrise durable, même dans les conditions difficiles.
- Excellent partenaire pour les mélanges en cuve ou la rotation avec des fongicides ayant des modes d'action différents.

Matière active

Pyraclostrobin – Groupe 11

Formule

Concentré émulsifiable

Une caisse contient

2 bidons de 6,5 L

Entreposage

Conserver le produit à l'écart des aliments pour les humains et les animaux, des semences et des engrais.

Protéger du gel.

Culture

Pommes de terre

Calendrier de traitement

Avant la fermeture des rangs, ou lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie (ce qui survient en premier)

Le fongicide Headline devrait être utilisé de façon préventive.


Maladies supprimées

Pommes de terre.

Alternariose (*Alternaria solani*)

Mildiou (*Phytophthora infestans*)

Essai avec Headline appliqué au démarrage de la tubérisation



Source: Felix Farms

BASF

We create chemistry



AgCelence^{MD}

Plus que prévu

Doses d'emploi

Un bidon traite de 9,7 à 14,4 ha (24 à 35,7 acres).

Culture	Maladies	Doses d'emploi
Pomme de terre	Alternariose	0,45 à 0,67 L/ha (0,18 à 0,27 L/ac)
	Mildiou	0,45 à 0,67 L/ha (0,18 à 0,27 L/ac)

En cas de forte pression des maladies et en période de croissance rapide des végétaux, utiliser la dose la plus élevée et mélanger en cuve avec un fongicide multisite comme le fongicide agricole Bravo[®] 500. Consulter l'étiquette du partenaire de mélange utilisé pour les doses, les recommandations supplémentaires et les restrictions relatives à l'utilisation.

Séquence du mélange

1. S'assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant l'utilisation.
2. Remplir la cuve à moitié d'eau propre et démarrer l'agitation.
3. Ajouter la quantité requise de Headline à la cuve.
4. Si on utilise un partenaire de mélange, ajouter la quantité appropriée.
5. Ajouter la quantité recommandée d'adjuvant, le cas échéant.
6. Continuer l'agitation tout en remplissant le reste de la cuve.
7. Après l'utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux directives de l'étiquette.

Conseils d'application

Résistance à la pluie – 1 heure

Délai de sécurité – 12 heures

Gestion de la résistance – Pour limiter les risques d'apparition de résistance, NE PAS faire plus d'une application avant d'alterner avec un produit ayant un mode d'action différent pour au moins une application. Ne pas faire plus de trois applications par saison.

Délai d'attente avant la récolte

6 jours

Mélanges en cuve

Communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions^{MD}** ou avec votre représentant BASF pour plus d'information sur les mélanges en cuve potentiels.

Pour plus d'information:

Appelez le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions** au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez **agsolutions.ca**.

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

AgSolutions et **HEADLINE** sont des marques déposées de BASF. Le fongicide **HEADLINE** devrait être utilisé dans le cadre d'un programme de lutte préventive contre les maladies. © 2020 BASF Canada Inc.

BRAVO^{MD} est une marque déposée d'une compagnie du groupe Syngenta.