

fongicide Pristine

fiche technologique

houblon

Protection préventive à large spectre avec avantages AgCelence^{MD}.

- Modes d'action multiples pour la suppression de l'oïdium et la répression du mildiou
- Cible plusieurs stades du cycle biologique de la maladie pour prévenir l'infection initiale et la propagation de la maladie
- Effet systémique local et résistance rapide au délavage par la pluie
- Avantages **AgCelence** exclusifs¹ pour une meilleure tolérance au stress et un potentiel de rendement accru

Matières actives

Boscalide – groupe 7
Pyraclostrobine – groupe 11

Type de formulation

Granulé mouillable

Une caisse contient

4 bidons de 2,83 kg

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, dépourvu de drain de plancher.

Cultures

Houblon

Appliquer en mode préventif, avant le développement de la maladie. Utiliser un intervalle court pendant les périodes de croissance rapide ou de forte pression de la maladie.

Calendrier de traitement

Appliquer à intervalles de 10 à 14 jours.

Ne pas faire plus de trois applications par saison.

Maladies supprimées

Dans le houblon.

Mildiou (*Pseudoperonospora humuli*)²

Oïdium (*Podosphaera macularis*)

¹ Les avantages **AgCelence** concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine. Toutes les comparaisons sont par rapport au traitement habituel du producteur, à moins d'indication contraire.

² Répression seulement.

Doses d'emploi

Un bidon de Pristine^{MD} traite de 1,8 à 11,3 ha (de 4,4 à 27 acres).

Houblon 105 g pour 100 L de solution diluée, max. de 1524 L/ha

Utiliser entre 234 et 468 litres de solution diluée à l'hectare (0,25-0,49 kg/ha) avant la pose du treillis et de 935 à 1524 litres de solution diluée à l'hectare (0,98 à 1,6 kg/ha) par la suite.

Séquence des mélanges

1. S'assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant de l'utiliser.
 2. Remplir la cuve à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
 3. Ajouter la quantité requise de fongicide Pristine dans la cuve.
 4. Continuer d'agiter tout en finissant de remplir la cuve.
 5. Après l'utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux recommandations de l'étiquette.
-

Conseils d'application

Résistance au délavage par la pluie – 1 heure.

Délai de sécurité après traitement – De 12 heures à 46 jours.

Consulter l'étiquette pour de plus amples détails.

Gestion de la résistance – Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs du fongicide Pristine avant d'alterner avec un fongicide offrant un mode d'action différent et n'appartenant pas aux groupes 7 ou 11. Ne pas faire plus de trois applications de fongicide Pristine par saison.

Délai d'attente avant la récolte

46 jours pour le houblon.

Mélanges en cuve

Aucun mélange n'est recommandé sur l'étiquette.

Pour plus d'information

Appelez le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions^{MD}** au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez **agsolutions.ca**.

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; AgCelence et PRISTINE sont des marques déposées de BASF SE; toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Le fongicide PRISTINE devrait être utilisé dans le cadre d'un programme de lutte préventive contre les maladies. © 2015 BASF Canada Inc.