

fongicide Vivando

fiche technologique

Un mode d'action exclusif pour une maîtrise exceptionnelle de l'oïdium.

- Absorption rapide et activité de vapeur permettant une couverture améliorée du feuillage et des fruits
- Un mode d'action exclusif qui supprime les populations résistantes à d'autres groupes chimiques et contribue à la gestion de la résistance
- Cible plusieurs stades du cycle biologique de la maladie pour prévenir initiale l'infection et la propagation de la maladie
- Large fenêtre d'application dans les raisins, les cerises, les cucurbitacées, les légumes-fruits, le houblon et les pêches

Matière active

Métrafénone – U8

Formulation

Suspension concentrée

Une caisse contient

4 bidons de 3,785 L

Entreposage

Protéger du gel.

Cultures

Cerises (sous-groupe 12-09A)

Raisins

Pêches (sous-groupe 12-09B)

Houblon

Cucurbitacées (sous-groupe 9)

Légumes-fruits

Calendrier de traitement

Appliquer à intervalles de 14 à 21 jours


Appliquer à intervalles de 14 jours

Appliquer à intervalles de 7 à 14 jours

Le fongicide Vivando^{MD} devrait être utilisé de manière préventive. Pendant les périodes de croissance rapide et de forte pression de la maladie, utiliser l'intervalle le plus court entre les traitements.

Maladies supprimées

Oïdium (blanc)



Source : Sommaire de recherches BASF.

Doses d'emploi

Un bidon de fongicide Vivando traite de 3,36 à 5 ha (8,3 à 12,5 acres).

Raisins	0,75 L/ha (303 ml/acre)
Cerises (sous-groupe 12-09A)	0,75 à 1,12 L/ha (303 à 453 ml/ac) ¹
Cucurbitacées (sous-groupe 9)	
Légumes-fruits	
Houblon	
Pêches (sous-groupe 12-09B)	

¹ Employer la dose la plus élevée en cas de forte pression de la maladie.

Séquence des mélanges

1. S'assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant de l'utiliser.
2. Remplir la cuve à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
3. Ajouter la quantité requise de fongicide Vivando dans la cuve.
4. Continuer d'agiter tout en finissant de remplir la cuve.
5. Après l'utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux recommandations de l'étiquette.

Conseils d'application

Résistance au délavage par la pluie – 1 heure.

Délai de sécurité après traitement – 12 heures pour toutes les cultures et activités, à l'exception de l'incision annulaire et de la réorientation des tiges des vignes (4 jours).

Gestion de la résistance – Vivando est un excellent outil de gestion de la résistance à inclure dans un programme de lutte intégrée. Ne pas faire plus de deux applications consécutives sans alterner avec un fongicide offrant un mode d'action différent. Pour limiter le risque d'apparition d'une résistance, ne pas faire plus de trois applications par saison.

Délai d'attente avant la récolte

- 7 jours pour les cerises (sous-groupe 12-09A).
- 0 jour pour les cucurbitacées (sous-groupe 9).
- 7 jours pour les légumes-fruits.
- 14 jours pour les raisins.
- 14 jours pour le houblon.
- 7 jours pour les pêches (sous-groupe 12-09B).

Mélanges en cuve

Aucun mélange n'est recommandé sur l'étiquette.

Communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions**^{MD} ou avec votre représentant BASF pour plus d'information sur les mélanges en cuve potentiels.

Pour plus d'information

Appelez le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions**^{MD} au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez **agsolutions.ca**.

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; **VIVANDO** est une marque déposée de BASF SE; toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Le fongicide **VIVANDO** devrait être utilisé dans le cadre d'un programme de lutte préventive contre les maladies. ©2016 BASF Canada Inc.