Herbicide Eragon LQ

fiche technologique

traitement non sélectif de présemis ou prélevée

Toute la puissance du traitement non sélectif dans une préparation liquide facile à utiliser.

- Vite absorbé, ce qui permet d'obtenir rapidement un désherbage complet
- Complète et améliore votre traitement de glyphosate
- Action rapide contre les principales mauvaises herbes à feuilles larges
- Le mode d'action du groupe 14 maîtrise les mauvaises herbes résistantes au glyphosate, aux triazines et aux herbicides du groupe 2
- Optimisation de la période de traitement herbicide-fongicide en postlevée dans le blé d'hiver

Ingrédient actif

Saflufenacil – Groupe 14

Préparation

Suspension concentrée à base aqueuse

Contenu d'une boîte

4 cruches de 1,182 L de Eragon[MD] LQ

Entreposage

Protéger du gel.
Conserver dans un endroit frais et aéré.

Non traité

Eragon LQ + glyphosate

Source : Essais de recherches autorisées de BASF, Bryanston, Ont., 2013.

Cultures	Période d'application
Orge (hiver, printemps)	présemis, prélevée
Maïs (de grande culture, sucré)	présemis, prélevée
Avoine	présemis, prélevée
Soya	présemis, prélevée
Blé (printemps, hiver, durum)	présemis, prélevée

Mauvaises herbes maîtrisées	Stade de développement maximum de la mauvaise herbe
Feuilles larges	
Plantain majeur[1]	début de la floraison
Vergerette du Canada[2]	20 feuilles
Petite herbe à poux[2]	8 feuilles
Pissenlit[3]	6 feuilles
Grande herbe à poux[1,2]	8 feuilles
Renouée persicaire[1]	8 feuilles
Chénopode blanc	8 feuilles
Laiteron des champs[1,4]	8 feuilles
Laitue scariole[1,5]	9 feuilles
Amarante à racine rouge	8 feuilles
Bourse-à-pasteur[1]	pleine floraison
Tabouret des champs[1]	pleine floraison
Abutilon[6]	8 feuilles
Renouée liseron[1]	8 feuilles
Moutarde des champs	8 feuilles

[1] Maîtrise à l'aide d'un mélange en réservoir de Eragon LQ et de glyphosate pour une application en présemis ou en prélevée.
[2] Incluant les biotypes résistants au glyphosate.
[3] Retard de croissance seulement.
[4] Maîtrise par brûlage des parties aériennes seulement.
[5] Parties aériennes seulement.
[6] Traitements de présemis et de prélevée dans le maïs de 59 à 118 mL/acre (146 à 292 mL/ha).

BASF
We create chemistry

Eragon[MD] LQ

Optimisé par **Kixor**[MD] herbicide

Activité de Eragon LQ

Optimisé par le mode d'action de l'herbicide Kixor[MD] (groupe 14), Eragon LQ est vite absorbé par les racines et les feuilles, puis circule rapidement dans toute la mauvaise herbe.

Une nouvelle approche du désherbage

Dans un mélange en réservoir avec le glyphosate, Eragon LQ procure un mode d'action additionnel pour maîtriser les biotypes résistants aux herbicides, comme la vergerette du Canada et l'herbe à poux. Lorsque utilisé à la dose élevée, il exerce également un effet résiduel à court terme contre les annuelles d'hiver, ce qui offre aux producteurs plus de liberté pour appliquer un herbicide de postlevée si nécessaire.

Pour plus d'information :

Appelez le Service à la clientèle **AgSolutions** au 1-877-371-BASF (2273)

Visitez **agsolutions.ca/fr**

Taux d'application

Le contenu d'une boîte permet de traiter de 40 à 160 acres (16 à 64 ha), selon la dose utilisée.

Orge, avoine, blé	Eragon LQ	30 à 59 mL/acre (73 à 146 mL/ha)
Maïs	Eragon LQ	59 à 118 mL/acre (146 à 292 mL/ha)
Soya	Eragon LQ	30 mL/acre (73 mL/ha)[7]

Tous les traitements

Glyphosate[8] (équivalent de 360 g/L)	1 L/acre (2,5 L/ha)
Adjuvant Merge[MD 8]	400 mL/acre (1 L/ha)

Volume d'eau

Application au sol	40 à 80 L/acre (10 à 20 gallons/acre)

[7] Ne pas utiliser une dose supérieure à 30 mL/acre (73 mL/ha), car cela risquerait d'endommager la culture. Pour utilisation en combinaison avec le glyphosate dans un traitement de présemis ou de prélevée.
[8] Le glyphosate (requis pour optimiser l'activité) et l'adjuvant Merge (requis) ne sont pas inclus dans la boîte.

Directives de mélange

1. Remplir le réservoir propre à moitié avec de l'eau propre et commencer l'agitation.
2. Déterminer la quantité nécessaire de Eragon LQ à l'aide d'une mesure étalonnée et verser dans le réservoir. Continuer à agiter.
3. Si un mélange en réservoir est utilisé, ajouter la quantité nécessaire de glyphosate tout en continuant à agiter.
4. Ajouter la quantité nécessaire d'adjuvant Merge en dernier.
5. Continuer l'agitation pendant le remplissage du réservoir avec le reste de l'eau nécessaire.

Conseils pour l'application

Entraînement par la pluie – Eragon LQ résiste très bien à l'entraînement par la pluie, mais la durée est limitée par la formulation de glyphosate utilisée.

Utiliser un volume d'eau d'au moins 40 L/acre (10 gallons/acre). Si les mauvaises herbes sont grosses ou si les populations sont denses, utiliser un volume d'eau de 80 L/acre (20 gallons/acre).

Délai d'attente avant la récolte

60 jours pour toutes les applications en présemis et en prélevée.

Cultures subséquentes

Pour le printemps de l'année subséquente qui suit une application au printemps en présemis ou en prélevée

Toutes les cultures peuvent être semées.

Pour le printemps qui suit une application à l'automne en présemis ou en prélevée

Orge	Pois sec de grande culture
Grain de l'alpiste des Canaries	Avoine
Canola	Soya
Pois chiche	Triticale
Maïs (de grande culture, sucré)	Blé (durum, printemps, hiver)

Mélanges en réservoir

Herbicide : Glyphosate (avec Merge)
Glyphosate + Pursuit[MD] (avec Merge)[9]

Veuillez consulter les étiquettes respectives des produits ou appelez le Service à la clientèle **AgSolutions**[MD] pour obtenir la liste des autres mélanges en réservoir recommandés.

[9] Pour le soya seulement.

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; ERAGON et KIXOR sont des marques déposées de BASF SE; PURSUIT est une marque déposée de BASF Agrochemical Products B.V.; toutes ces marques sont utilisées avec permission accordée à BASF Canada Inc. MERGE est une marque déposée de BASF Canada Inc. © 2016 BASF Canada Inc.